

Orientações para manometria esofágica

- A manometria esofágica é realizada com o paciente acordado, pois é necessário sua colaboração.
- Não é necessário o paciente vir acompanhado.
- É utilizado somente anestesia local.
- Após o término do exame o paciente poderá se alimentar, dirigir, trabalhar, enfim levar sua vida normalmente.

Jejum absoluto por 8h (incluindo água)

- Se o paciente for realizar simultaneamente a **pHmetria de 24horas**, favor seguir as orientações para **pHmetria** abaixo.

Orientações para a pHmetria de 24h

- **Jejum absoluto por 8h (incluindo água).**

Há vários medicamentos que causam interferência na acidez gástrica e devem ser suspensos antes da pHmetria:

- **Antiácidos: suspender 24h antes do exame:**

Exemplos: Mylanta Plus, Maalox, Hidróxido de Alumínio, Hidróxido de Magnésio Colantyl, Sonrisal, Sal de frutas;

- **Pro-cinéticos: suspender 3 DIAS antes do exame;**

-

Metoclorpramida, Bromoprida, Domperidona, Cisaprida, Plasil, Motilium, Plamet, Dramin, Digesan.

- **Bloqueadores ácidos: suspender 10 DIAS antes do exame:**

-

Omeprazol, Peprazol, Losec, Victrix, Lansoprazol, Prazol, Lanz, Pantoprazol, Pantozol, Pantocal, Pariet, Nexium, Cimetidina, Tagamet, Ranitidina, Logat, Antak, Famotidina, FamoxFamose, Niztidina, Axid;